

ค่างห้าสี

Red-shanked Douc

Pygathrix nemaeus

Description The colorful Red-shanked Douc looks like a potbellied little man wearing a gray shirt and black pants.

Distribution Red-shanked Douc are found in Cambodia , Laos and Vietnam.

behavior Red-shanked Douc are diurnal and eat , sleep and feed in the trees of the forest.

Reproduction The pregnanay lasts 180 to 190 days resulting in the birth of a single offspring.

ลักษณะ ค่างห้าสีมีองคูล้ายเด็กพุงโต ใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาและใส่กางเกงสีดำ

เขตแพร่กระจาย พบในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม

พฤติกรรม เป็นสัตว์หากินกลางวัน อาศัยกินนอนบนต้นไม้ในป่า

การสืบพันธุ์ ตั้งท้องนาน 180 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

เสือโคร่งเบงกอล
Bengal tiger
Panthera tigris tigris

- Description** The Bengal tiger 's coat is a yellow to light orange, and the stripes range from dark brown to black, the belly is white, and the tail is white with black rings.
- Distribution** It is a tiger subspecies nation to India, Bangladesh, Nepal and Bhutan.
- Behavior** Tigers live independently in its own territory. They do not live as family units because the male plays no part in raising his offspring.
- Reproduction** After a gestation period of 104-106 days, 1-4 cubs are born.
- ลักษณะ** สีขนของเสือโคร่งเบงกอลเป็นสีเหลืองถึงสีส้ม แถบของมันมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ ท้องมีสีขาว หางมีสีขาว มีวงเป็นสีดำ
- เขตแพร่กระจาย** เป็นเสือโคร่งชนิดย่อยของประเทศอินเดีย บังกลาเทศ เนปาล และภูฏาน
- พฤติกรรม** ชอบอยู่อาศัยตัวเดียวในอาณาเขตของตัวเอง ไม่อยู่อาศัยเป็นครอบครัว เนื่องจากตัวผู้ไม่มีบทบาทในการเลี้ยงดูลูก
- การสืบพันธุ์** ตั้งท้องนาน 104-106 วัน ออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว

เสือโคร่งอินโดจีน

Indochinese Tiger

Panthera tigris corbetti

- Description** Indochinese tiger is a subspecies of tiger. The average indochinese tiger is approximately 2.74 M long and weighs about 180 kg.
- Distribution** They are found in Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam.
- Behavior** Indochinese tiger prey mainly on medium-and large-sized wild ungulates. Sambas deer, wild pigs, and large bovids such as banteng.
- Reproduction** The gestation period is 16 weeks. The litter size usually consists of around 3-4 cubs.
- ลักษณะ** เสือโคร่งอินโดจีนเป็นชนิดย่อยของเสือโคร่ง มีความยาวลำตัวเฉลี่ย 2.74 เมตร น้ำหนักตัว 180 กิโลกรัม
- เขตแพร่กระจาย** พบในกัมพูชา ลาว พม่า ไทยและเวียดนาม

หมีควาย

Asian Black Bear

Ursus thibetanus

ลักษณะ	หมีควายเป็นหมีขนาดกลาง สูง 70-100 เซนติเมตร หนัก 113 กิโลกรัม
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปเอเชีย
พฤติกรรม	ปกติเป็นสัตว์หากินกลางวัน แต่ถ้าอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของคนอาจเปลี่ยนเป็นหากินกลางคืน อยู่อาศัยเป็นครอบครัว โดยมีพ่อแม่และลูกอีก 2 ตัว
การสืบพันธุ์	แม่หมีจะออกลูกในถ้ำหรือโพรงไม้ในหน้าหนาวหรือก่อนฤดูใบไม้ผลิ ระยะตั้งท้องนาน 200-240 วัน
Description	The Asian black bear is a medium-sized species of bear. They measure 70-100 cm. in shoulder height, with an average weight of about 113 kg.
Distribution	They are found in Asia.
Behavior	Asian black bear are diurnal, though they become nocturnal near home habitations. They may live in family groups consisting of two adults and two young.
Reproduction	Female usually give birth in caves or hollow trees in winter or early spring and gestation period of 200-240 days.

หมีหมา

Sun Bear

Ursus malayanus

ลักษณะ	หมีหมามีความยาว 120-150 เซนติเมตร ทำให้มันเป็นหมีที่เล็กที่สุดในโลก ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย 10-45 %
เขตแพร่กระจาย	พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและจีน
พฤติกรรม	อาหารของหมีหมา ประกอบด้วย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ผลไม้ ใบไม้ ไข่ และสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก
การสืบพันธุ์	ตัวเมียจะให้ลูก 1-2 ตัว ต่อปี ระยะเวลาตั้งท้อง 96 วัน

Description	The sun bear is 120-150 cm. long, making it is the smallest member in the bear family. Males tend to be 10-45% larger than females.
Distribution	They are found in southeast Asia, India and China.
Behavior	The diet of the sun bear consists mainly of invertebrates, fruits, leaves, eggs and small vertebrates.
Reproduction	A female sun bear can produce 1 to 2 cubs per year. Sun bear has a roughly 96 days gestation period.

สิงโต

Lion

Panthera Leo

ลักษณะ	สิงโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวและใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเสือโคร่ง ตัวผู้จะมีแผงคอเป็นลักษณะเด่น น้ำหนักตัวผู้ 150-250 กิโลกรัม ตัวเมีย 120-150 กิโลกรัม
เขตแพร่กระจาย	พบในประเทศอินเดียและทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	สิงโตจะล่าเหยื่อขนาดใหญ่และขนาดกลาง ชอบล่าวิลเดอบีสต์ ในขณะที่ฝูงของวิลเดอบีสต์อพยพประจำปีผ่านอาณาเขตของสิงโต นอกจากนี้ยังล่าควายป่า ม้าลาย แอนทิลอป ยีราฟ หมูป่า และยังชอบขโมยซากจากผู้ล่าตัวอื่น
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 105-118 วัน ให้ลูกครอกละ 3-4 ตัว

Description	The lion is a mammal of family felidae. The lion is the second largest Feline species, after the tiger. The male lion, easily recognized by his mane, weighs between 150-250 kg. Females range 120-150 kg.
Distribution	They are found in India and Africa.
Behavior	Lions feed on a variety of large and medium-size prey. They prefer wildebeest to all others when the annual migration brings the vast herds through the pride's range. Otherwise they eat buffalo, zebra, antelope, giraffe, and warthogs. They also steal kills and carrion from other predators.
Reproduction	The period of gestation for the lioness is between 105 and 118 days and usually three or four cubs will be born.

กวางผา

Chinese Goral

Naemrhedus griseus

ลักษณะ	กวางผาเป็นสัตว์กีบ ขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายแพะ หนัก 25-40 กิโลกรัม สูง 80-130 เซนติเมตร
เขตแพร่กระจาย	พบในประเทศพม่า จีน อินเดีย ไทย เวียดนาม และลาว
พฤติกรรม	มักพบอาศัยบนภูเขาสูง กินหญ้า ใบไม้ ผลไม้
การสืบพันธุ์	ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ตั้งท้องนาน 6 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว

Description	Chinese goral is small ungulates with a goat-like appearance. Goral typically weigh 25-40 kg. and 80-130 cm. in length.
Distribution	They are found in Burma, China, India, Thailand, Vietnam and Laos.
Behavior	Goral are often found on rocky hillsides at high elevations. They eat grass, leaves and fruits.
Reproduction	They mate during November to December, The mother carry the foal for six months and will give birth to one foal at a time.

ช้างเอเชีย

Asian elephant

Elephas maximus

ลักษณะ	โดยทั่วไปช้างเอเชียจะมีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกา และมีจุดสูงสุดอยู่ที่หัว โดยมีหลังนูนหรือเรียบ
เขตแพร่กระจาย	พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดียทางตะวันตกถึงเกาะบอร์เนียวทางตะวันออก
พฤติกรรม	ช้างออกหากินช่วงใกล้พลบค่ำ เป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ กินพืชถึงวันละ 150 กิโลกรัมต่อวัน
การสืบพันธุ์	ระยะตั้งท้องนาน 18-22 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว บางครั้งอาจ 2 ตัว

Description	In general, Asian elephant are smaller than African elephants and have the highest body point on the head. Their back is convex or level.
Distribution	They distributed in southeast Asia from India in the west to borneo in the east.
Behavior	Elephants are crepuscular. They are mega herbivores and consume up to 150 kg. of plant matter per day.
Reproduction	The gestation period is 18-22 months, and the female give birth to one calf, or occasionally twins.

ยีราฟ

Giraffe

Giraffa camelopardalis

ลักษณะ	ยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กีบคู่ เป็นสัตว์บกที่สูงที่สุด และเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ใหญ่ที่สุด
เขตแพร่กระจาย	พบทางตอนกลางและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	พบอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม อาจพบถึงฝูงละ 40 ตัว
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 400-460 วัน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว

Description	The Giraffe is even-toed ungulate mammal, the tallest of all land-living animal species, and the largest ruminant.
Distribution	It's range extends in Central Africa to South Africa.
Behavior	Giraffes are usually found in groups. Giraffes groups can range from over 40 individuals.
Reproduction	Giraffe gestation lasts between 400 and 460 days, after which a single calf is normally born.

แรดขาว

White rhinoceros

Ceratotherium simum

ลักษณะ	แรดขาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของแรดในโลกที่ยังเหลืออยู่ มีปากกว้าง ใช้สำหรับเล็มหญ้า
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	พบในทุ่งหญ้า ชอบกินหญ้า กินน้ำวันละ 2 ครั้ง ถ้ามีน้ำให้กิน
การสืบพันธุ์	ระยะตั้งท้องนาน 16-18 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว

Description	The White rhinoceros is one of the live species of rhinoceros that still exist. It has a wide mouth used for grazing.
Distribution	They are found in Africa.
Behavior	White rhinoceros are found in grassland and savannah habitat. Herbivore grazers that eat grass. It drinks twice a day if it is available.
Reproduction	Gestation occurs around 16-18 months. A single is born.

เลียงผา

Samatran Serow

Capricornis sumatraensis

ลักษณะ	เลียงผามีสีลำตัวสีดำ ช่วงท้องมีสีน้ำตาลดำ เหนือก้นมีสีน้ำตาลอมส้ม แฉกคอมีสีดำขาว และน้ำตาลอมส้ม ปาก คาง ออก มีสีน้ำตาลขาว
เขตแพร่กระจาย	อาศัยอยู่บนภูเขาของเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมลายู
พฤติกรรม	โดยทั่วไปจะอยู่ตัวเดียว แต่บางครั้งอาจพบอยู่เป็นฝูง
การสืบพันธุ์	ตั้งท้อง 7 เดือน มีลูกครั้งละ 1 ตัว

Description	General color is black, with brownish-black underpants, and the area above the hoofs tawny. The mane is composed of black, white and tawny hairs. Lips, chin and throat are Buffy white.
Distribution	They are found on the mountains and higher regions of Sumatra and the Malay Peninsula.
Behavior	The samatran serow is generally a solitary animal, although it may sometimes move about in groups of several individuals.
Reproduction	The gestation lasts 7 mouths and has one calf per litter.

หมูป่าแม่น้ำแดง

Red River Hog

Potamochoerus porcus

ลักษณะ	หมูป่าแม่น้ำแดงเป็นหมูป่าชนิดหนึ่ง มีผิวหนังสีแดง ขาสีดำ มีแถบสีขาวในแนวสันหลัง
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	ชอบอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ หนองน้ำ อาศัยอยู่เป็นฝูง 6-20 ตัว โดยมีตัวผู้เป็นผู้นำ
การสืบพันธุ์	แม่หมูจะเลี้ยงลูกคละกละ 3-6 ตัว

Description	The red river hog is a wild member of the pig family. The red river hog has striking red fur, with black legs and white stripe along the spine.
Distribution	They are found in Africa
Behavior	The red river hog prefers areas near river or swamps. Red river hogs typically live in herds of six to 20 members led by a dominant boar.
Reproduction	Sows rear three to six piglets at a time.

ฮิปโปโปแตมัส

Hippopotamus

Hippopotamus amphibious

ลักษณะ	เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อันดับ 3 รองจากช้างและแรด
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	ชอบอาศัยอยู่ในน้ำ พบตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ป่าโกงกาง ชอบอาศัยอยู่กันเป็นฝูง 5-30 ตัว โดยมีตัวผู้คุมฝูง กับตัวเมียหลายตัว และลูก ๆ
การสืบพันธุ์	ถึงวัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุ 5-6 ปี ระยะตั้งท้อง 8 เดือน
Description	The hippopotamus is a large herbivorous mammal. After the elephant and rhinoceros, the hippopotamus is the third largest land mammal.
Distribution	They are found in Africa.
Behavior	The hippopotamus is semi-aquatic, inhabiting rivers, lakes and mangrove swamps, where territorial bulls preside groups of 5 to 30 females and young.
Reproduction	Female hippos reach sexual maturity at five to six years of age and have a gestation period of 8 months.

ไฮยีน่าลายจุด
Spotted Hyena
Crocuta crocuta

ลักษณะ	เป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายหมา โดยมีหลังลาดลง ลำตัวมีขนสีครีมถึงสีน้ำตาลจาง ๆ พร้อมกับมีลายจุดสีเข้ม จมูกมีสีดำ มีหางเป็นพวง ปลายหางมีสีดำ ห้วมีขนาดใหญ่และกรามแข็งแรงมาก
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	จะออกหากินช่วงกลางคืน สามารถเดินได้ไกล 70 กม. ในช่วงกลางวันจะพักอยู่ในร่มเงาหรือนอนแช่น้ำตื้น ๆ อาหารได้แก่ พวกแอนทิโลปขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น วิลเดอบีสต์ เจมส์บอก และอิมพาล่า
การสืบพันธุ์	ให้ลูกได้ทั้งปี ครอกละ 1 – 2 ตัว ระยะตั้งท้อง 90 วัน

ไฮยีน่าลายแถบ
Striped Hyena
Hyaena hyaena

ลักษณะ	เป็นสัตว์ขนาดกลาง มีลำตัวสั้น ขายาว ขาหลังสั้นกว่าขาหน้า
เขตแพร่กระจาย	พบทางเหนือและตะวันออกของทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	เป็นสัตว์หากินกลางคืน จะออกจากถ้ำตอนหัวค่ำและกลับมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 90-91 วัน
Description	The Striped Hyena has a fairly massive, but short torso set on long legs. The hind legs are significantly shorter than forelimbs.
Distribution	Striped Hyena native to North and East Africa.
Behavior	The Striped Hyena is a primarily nocturnal animal, which typically only leaves its den at the onset darkness, retuning before sunrise.
Reproduction	The gestation period is 90-91 days.

จิงโจ้แดง
Red Kangaroo
Macropus rufus

ลักษณะ	เป็นจิงโจ้ขนาดใหญ่ มีหูยาวและแหลมปากเป็นรูปสี่เหลี่ยม
เขตแพร่กระจาย	พบในแผ่นดินใหญ่ของทวีปออสเตรเลีย
พฤติกรรม	ชอบอยู่ตัวเดียวหรืออยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เรียกว่า ม็อบ แต่ละม็อบพบ 2-10 ตัว
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 33 วัน มีลูกครั้งละ 1 ตัว
Description	Red kangaroo is a very large kangaroo with long, pointed ears and a squared muzzle.
Distribution	It is found in across mainland Australia.
Behavior	The Red kangaroo live alone or in small groups called "Mobs" Each mob is usually made up of 2 to 10 kangaroo.
Reproduction	The neonate gestation after only 33 days. Usually only one young is born at a time.

คาพีบาร์

Capybara

Hydrochaeris hydrochaeris

ลักษณะ	เป็นสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักประมาณ 55 กก. มีรูปร่างอ้วน มีความยาว 1 ม. สูง 60 ซม. มีสีน้ำตาลถึงแดง หาและหูอยู่ส่วนบนของหัว ทำให้ง่ายต่อการว่ายน้ำ
เขตแพร่กระจาย	พบในอเมริกาใต้
พฤติกรรม	เป็นสัตว์สังคม อยู่เป็นกลุ่มโดยมีตัวผู้เป็นจ่าฝูง เป็นสัตว์กินพืช กินหญ้า และพืชน้ำ
การสืบพันธุ์	ผสมพันธุ์ในน้ำ ตั้งท้องนาน 130 วัน ครอกละ 2-8 ตัว

Description	The world's largest rodent. They weight around 55 kg. This stocky body animal has a length of about 1 m. and a height at shoulder around 60 cm. It ranges in color from brown to reddish. The eyes and ears are high on the head so they can easily be kept above water when swimming.
Distribution	They are found in South America.
Behavior	Capybaras are highly social rodent and live in groups controlled by a dominant male. The capybara is a grazing herbivore. They mainly eat grasses and aquatic plants.
Reproduction	Mating taken place often in the water and after a period of 130 days, a litter of 2-8 babies born.

แบทเอียร์ฟอกซ์ สุนัขจิ้งจอกหูค้างคาว

Bat-eared Fox

Otocyon megalotis

ลักษณะ	แบทเอียร์ฟอกซ์เป็นสัตว์ตระกูลหมาป่าของทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา ชื่อของมันมาจากหูที่มีขนาดใหญ่ มีขนสีน้ำตาล ส่วนหู ขา ใบหน้ามีสีดำ มีความยาวลำตัว 55 ซม. หูยาว 13 ซม.
เขตแพร่กระจาย	พบในทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	เป็นสัตว์หากินกลางคืน อาศัยเป็นกลุ่มเล็กประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ชอบกินแมลงเป็นหลัก ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นปลวก อีก 40% เป็นแมลงปีกแข็ง อีก10%เป็นหนูและกิ้งก่า
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 10 สัปดาห์ ให้ลูกครอกละ 4-6 ตัว
Description	The Bat-eared fox is a canid of African Savanna. It is named after its huge conical ears. Bat-eared foxes have tawny fur. Ears, legs and parts of the face are black. They are 55 cm. in length. Their ears are 13 cm. long.
Distribution	They are found in Africa.
Behavior	Bat-eared foxes are nocturnal animals that live in small groups consist of a couple and their offsprings. This fox eats mostly insects. Termites make up half of their diet, 40% are beetles and less than 10% are mice and lizards.
Reproduction	the gestation period is around 10 weeks and 4-6 cubs are born.

เมียร์แคท

Meerkat

Suricata suricatta

ลักษณะ	เป็นพังพอนขนาดเล็ก น้ำหนัก 731 กรัม มีความยาว 25-35 เซนติเมตร
เขตแพร่กระจาย	พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
พฤติกรรม	ชอบกินแมลง แต่ก็สามารถกิน จิ้งจก ตุ๊กแก งู แมงมุม พืชและไข่ ชอบออกหากินเป็นฝูง
การสืบพันธุ์	วัยเจริญพันธุ์ที่อายุ 1 ปี ให้ลูกครอกละ 1-5 ตัว
Description	The meerkat is a small mongoose; weight about 731 grams; body length of 25 to 35 centimeters.
Distribution	They are found in south of Africa.
Behavior	Meerkats are primarily insectivores, but also eat lizards, snakes, spiders, plants, and eggs. Meerkats forage in a group.
Reproduction	Meerkats become sexually mature at about one year of age and produce one to five pups in a litter.

สมเสร็จจมาลยู (สมเสร็จไทย)

Malayan Tapir

Tapirus indicus

ลักษณะ	ลำตัวด้านหน้าและขาหลังมีสีดำ ส่วนที่เหลือเป็นสีขาว หางของมันไม่หนา คล้ายหมู มีขนสั้นๆ หางสั้น มีจมูกยื่นยาว
เขตแพร่กระจาย	พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พฤติกรรม	เป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยว แต่บางครั้งพบอยู่เป็นคู่ในป่าทึบ ออกหากินในเวลากลางคืน อาหารได้แก่ ใบไม้ ผลไม้ พืชน้ำ
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 400 วัน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว
Description	Short, smooth and slick coat is strikingly colored with the rear half above the legs being white, while the rest of the coat is black, except for white ear fringes. The tail is not more than a large stump, but the nose is extended.
Distribution	They are found in Southeast Asia.
Behavior	The tapir is primarily solitary, but sometimes lives in pairs in the thickest part of the forest. Malayan tapirs are nocturnal. The eat leaves, fruits, and aquatic plants.
Reproduction	Gestation lasts about 400 days. After which one young is born.

สมเสร็จบราซิล

Brazilian Tapir

Tapirus terrestris

ลักษณะ	เมื่อโตเต็มที่จะมีแผงขนบริเวณท้ายทอยถึงไหล่ ขนบริเวณลำตัวจะสั้น มีจมูกยาวคล้ายงวงช้างสั้น ๆ มีหางสั้น ลำตัวยาว 6 ฟุต ความสูงถึงหัวไหล่ 3 ฟุต หนักมากกว่า 500 ปอนด์
เขตแพร่กระจาย	พบที่ทวีปอเมริกาใต้ ตั้งแต่ประเทศเวเนซุเอลา โคลอมเบีย บราซิล อาเจนตินา
พฤติกรรม	เป็นสัตว์ที่อยู่ตัวเดียว ในป่าไผ่น้ำ วายน้ำแก่ง อาหารได้แก่ ใบไม้ หน่อไม้ ผลไม้ หญ้า พืชต่าง ๆ
การสืบพันธุ์	ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 400 วัน

Description	The adults possess a kind of spare mane, but otherwise the hair is short. A rather long elephant-like nose is formed by the upper lip and the nose, while the small tail is inconspicuous. The Brazilian tapir can reach six feet long, three feet at the shoulders, and over 500 pounds.
Distribution	The Brazilian tapir can be found in South America. Its range from Venezuela, Colombia, Brazil, and Argentina.
Behavior	This solitary species lives in forests and near water, and can swim quite well. They feed on leaves, buds, fruits, grasses and aquatic plants.
Reproduction	A single young is born after about 400 days of gestation.

เสือโคร่งขาว
WHITE TIGER
Panthera tigris

ลักษณะ	สีที่ซีดของเสือโคร่งขาว เกิดจากลักษณะของยีนด้อย เสือโคร่งขาวมีแนวโน้มจะ ตัวใหญ่กว่าเสือโคร่งปกติ ทั้งขนาดแรกคลอดและเมื่อโตเต็มวัย
เขตแพร่กระจาย	พบในประเทศอินเดียและเนปาล
พฤติกรรม	เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่ง แต่ปีนต้นไม้ไม่เก่ง ชอบหากินกลางคืน
การสืบพันธุ์	การผสมพันธุ์เกิดได้ทั้งปี ทั้งปี แต่มักเกิดเดือนพฤศจิกายนและเมษายน ระยะตั้งท้องนาน 16 สัปดาห์ ให้ลูกคลอดละ 3-4 ตัว
Description	A White tiger's pale coloration is caused by the presence of a recessive gene white tiger tend to be larger both at birth and at full adult size.
Distribution	They found in India and Nepal
Behavior	The White tiger in a good swimmer but a very poor climber. They mostly hunt at night
Reproduction	Mating can occur all year round, but is generally more common between November and April. The gestation period is 16 weeks. The litter size usually consists of around 3-4 cubs.

เสือโคร่งสีทอง

Golden tiger

Panthera tigris

ลักษณะ	: เสือโคร่งสีทองเป็นเสือโคร่งที่มีสีเปลี่ยนไปจากปกติ เนื่องจากยีนด้อย ซึ่งเกิดจากผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยง ไม่พบในธรรมชาติ
เขตแพร่กระจาย	: ลูกเสือโคร่งสีทองตัวแรกเกิดในปี 1983 ที่มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤติกรรม	: เสือโคร่งสีทอง เมื่อโตเต็มวัยชอบอาศัยอยู่ตัวเดียว ว่ายน้ำเก่ง
การสืบพันธุ์	: ระยะตั้งท้อง 93 – 112 วัน ให้ลูกครั้งละ 2 – 3 ตัว
Description	: A golden tiger is a tiger with a color variation caused by a recessive gene. The coloration is a result of captive breeding and does not occur in the wild.
Distribution	: The first golden tiger cub born in captivity was in 1983 in Florida.
Behavior	: Adult tigers lead largely solitary lives. Tiger are strong swimmers.
Reproduction	: Gestation can range from 93 to 112 days. The litter is usually two or three cubs.

เสือลายเมฆ

Clouded leopard

Neofelis nebulosa

ลักษณะ	มีขนสีน้ำตาล สีเทา มีลายตามลำตัวไม่เป็นระเบียบ มองดูคล้ายก้อนเมฆ
เขตแพร่กระจาย	พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน
พฤติกรรม	เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตัวเดียว หากินกลางคืน
การสืบพันธุ์	ตั้งท้องนาน 85-93 วัน ให้ลูก 2-4 ตัว

Description	Clouded leopard have a tan or tawny coat, and are distinctively marked with large, irregularly – shaped, dark-edged ellipses which are said to be shaped like clouds.
Distribution	The Clouded leopard is found only in Southeast Asia and China.
Behavior	It is assumed that it is a generally solitary creature, and it appear to be primarily nocturnal.
Reproduction	Females give birth to a litter of 2 to 4 cubs after a gestation period of about 85 to 93 days.

ลิงกระรอก

Squirrel Monkey

Saimiri sciureus

ลักษณะ	ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย จะมีสีขาวรอบดวงตา หู คอ บนหัวมีสีดำ ขาหน้า มือ เท้า จะมีสีแดงหรือเหลือง หัวไหล่ ขาหลังมีสีเทา
เขตแพร่กระจาย	พบในประเทศโคลัมเบีย ทางเหนือของประเทศเปรู และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
พฤติกรรม	เป็นสัตว์หากินกลางวัน อาศัยอยู่บนต้นไม้ หางของมันไม่ได้ใช้ในการปีนแต่ช่วยให้ร่างกายมีความสมดุล กินแมลง ไช้หนก ผลไม้ และถั่ว
การสืบพันธุ์	ตั้งท้อง 6 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว

Description	Males are larger than females. Most common coloration is white around eyes, ears, throat, and on sides of neck. Top of head is black, back forearms, hands, and feet are reddish or yellow with shoulders and hind feet suffused with gray.
Distribution	They are found in Columbia and northern Peru to northeastern Brazil.
Behavior	They are diurnal and arboreal. Their tail is not used for climbing, but as a kind of “balancing pole”. They eat insects, bird eggs, fruit, and nuts.
Reproduction	Single young born after 6 months gestation.

ฮิปโปแคระ

Pygmy Hippopotamus

Choeropsis liberiensis

ลักษณะทั่วไป : มีน้ำหนัก 160 – 250 กก. สูง 0.8 เมตร ความยาวหัวถึงหาง 1.5 เมตร มีรูปร่างคล้ายหมู มีหัวเล็กขาและคอยาวกว่า เมื่อเทียบกับไนล์ ฮิปโป

ถิ่นที่อยู่ : พบทางฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ในประเทศไลบีเรีย เซราลีโอป กินี และไอวอรีโคสต์

นิสัยและอาหาร : จะชอบอยู่โดดเดี่ยว และไม่ชอบน้ำเมื่อเทียบกับไนล์ ฮิปโป เป็นสัตว์กินพืช เช่น ใบไม้ หญ้า รากไม้ และผลไม้ร่วง

การขยายพันธุ์ : ตั้งท้องนาน 6 – 7 เดือน ให้ลูกครั้งละ 1 ตัว

General Description : They weigh 160 to 250 kg., stand about 0.8 m. tall at the shoulder, and measure about 1.5 m. from head to tail. They are more pig-like in shape than Nile hipopotamuses, with proportionately smaller heads and proportionately longer legs and necks.

Natural Distribution : They are found in West Africa, in Liberia, Sierra Leone, Guinea and the Ivory Coast.

Habits and Diet : They are more solitary than their larger relations and considerably less aquatic. They are herbivores and feed on various vegetation, leaves, roots, grasses and fallen fruits.

Reproduction : gestation is 6 to 7 months, after which a single calf is born.

ม้าลาย

Zebra

Equus burchellii

ลักษณะ	เป็นสัตว์ขนาดกลาง ลำตัวหนา ขาสั้น สูง 1.4 เมตร ยาว 2.3 เมตร น้ำหนัก 220-322 กิโลกรัม
เขตแพร่กระจาย	พบตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปีย ทางฝั่งตะวันออก ของทวีปแอฟริกา ทางใต้ถึงประเทศแองโกลา
พฤติกรรม	เป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวโดยมีตัวผู้คุมฝูงตัวเมีย
การสืบพันธุ์	แม่มาให้ลูก 1 ตัว ทุก 12 เดือน

Distribution	The zebra is mid-sized and thick bodied with relatively short legs. Adults of both sexes stand about 1.4 meters high at the shoulder , are approximately 2.3 meters long, and weigh around 220-322 kg.
Distribution	It ranges from the south of Ethiopia through East Africa to as far south as Angola.
Behavior	The zebra is highly social and usually form small family groups called harem.
Reproduction	Mare May give birth to one foal every twelve months.

กระทิง

Gaur

Bos gaurus

ลักษณะ	กระทิงเป็นวัวป่าที่ใหญ่ที่สุด น้ำหนัก 650-1,000 กิโลกรัม
เขตแพร่กระจาย	อาศัยอยู่บริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พฤติกรรม	เป็นสัตว์หากินกลางคืน ผูกกระทิงมีจำฝูงเป็นตัวเมียอายุมาก ตัวผู้เต็มวัยมักจะอยู่อาศัยอยู่เดียว
การสืบพันธุ์	ออกลูกครั้งละ 1 ตัว บางครั้งอาจพบ 2 ตัว ระยะตั้งท้องนาน 275 วัน
Description	The gaur is the largest of wild cattle. The average weight is 650 to 1,000 kg.
Distribution	The gaur is native to south Asia and southeast Asia.
Behavior	They are basically nocturnal. Gaur herds are led by an old adult female. Adult males may be solitary.
Reproduction	Gaur have one calf (or occasionally two) after a gestation period of about 275 days.

นกฟลามิงโกใหญ่
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus

ลักษณะ : เป็นนกฟลามิงโกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สูง 110-150 เซนติเมตร น้ำหนัก 2-4 กิโลกรัม

เขตแพร่กระจาย : พบในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และทางตอนใต้ของทวีปยุโรป

พฤติกรรม : ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่เป็นดินโคลน ชายฝั่งทะเล ใช้เท้าคุ้ยเหยื่อตามพื้น

การสืบพันธุ์ : วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง บนรังที่ทำด้วยดินโคลน

Description : This is the largest species of flamingo , averaging 110-150 cm. tall and weighing 2-4 kg.

Distribution : It is found in parts of Africa , southern Asia and southern Europe.

Behavior : The bird resides in mudflats and shallow coastal lagoons with salt water. Using its feet , the bird stirs up the mud.

Reproduction : This species lays a single egg on a mud mound.

นกฟลามิงโกอเมริกัน
American flamingos
Phoenicopterus ruber

ลักษณะ : นกฟลามิงโกอเมริกัน มีขนาดเล็กกว่านกฟลามิงโกใหญ่ สูง 120-145 เซนติเมตร

เขตแพร่กระจาย : พบในประเทศโคลัมเบีย เวเนซุเอลา และทางใต้ของรัฐฟลอริดา

พฤติกรรม : ชอบที่อยู่อาศัยเป็นชายฝั่งทะเล มีโคลน น้ำกร่อยหรือทะเลสาบ

การสืบพันธุ์ : ฟักไข่นาน 28-32 วัน

Description : Adult American flamingos are smaller on average The Greater Flamingos. They measure from 120 to 145 cm tall.

Distribution : The American flamingos breeds in Colombia, Venezuela and southern Florida.

Behavior : Its preferred habitats saline lagoons, mudflats, and shallow brackish coastal or inland lakes.

Reproduction : Incubation until hatching takes from 28 to 32 days.